

Afspraak

Uw afspraak is op / /

om : uur

Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Telefoon: **056/ 62 33 55**

Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Zaterdag van 9u tot 12u

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht op het secretariaat van de Dienst Radiologie.

Telefoon: **056/ 62 33 55**

Radiologen

Dr. E. Janssens

Dr. F. Van Geluwe

Dr. J. Van Melkebeke

Dr. Tom D'Hoore

Dr. Simon Vanden Berghe

Contact

Secretariaat radiologie:

056/ 62 33 55

Telefoonnummer onthaal:

056/ 62 31 11



Infobrochure
RADIOLOGIE

Auteur: Dienst Radiologie
Publicatiedatum: Oktober 2021
Doc: 5702

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Stereotaxie

Wat?

Bij een stereotaxie van de borst neemt de radioloog een klein stukje weg uit de borst aan de hand van mammografie opnames. Dit stukje borstklierweefsel wordt nadien opgestuurd voor verder onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij borstletsels die echografisch niet zichtbaar zijn (zoals kleine verkalkingen in de borst).

Vorbereiding

Als U bloedverduunners of Aspirine neemt, moet u dit op voorhand melden aan de radioloog.

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam volledig vrij maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een speciale onderzoekstafel (in liggende of zittende houding).

De borst wordt door het mammografietoestel lichtjes samengedrukt en de radioloog bepaalt de exacte punctieplaats.

De huid wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. In de huid wordt een kleine snede gemaakt waardoor de punctienaald gemakkelijk ter plaatse kan worden gebracht.

Er worden opnames gemaakt vanuit verschillende hoeken om de juiste diepte en plaats van het letsel te bepalen. Na het plaatsen van de biopsienaald worden verschillende stukjes weefsel weggenomen. U ervaart geen pijn gedurende deze procedure omdat de huid en het omliggende weefsel verdoofd zijn. Enkel bij het aanzuigen van het weefsel kan men iets gewaarworden.

Na het onderzoek

Na het verwijderen van de naald is het belangrijk om krachtig en lang te drukken op de insteekplaats om bloeden te voorkomen.

Daarna wordt het wondje verzorgd door de verpleegkundige. Na een vijftal dagen mag U de pleisters verwijderen.

Thuis mag u, indien nodig een pijnstiller nemen (Bv. Dafalgan, geen Aspirine of Asprinebevattende medicatie).

Een blauwe plek na de punctie is volledig normaal..

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Resultaat

De bekomen borstweefselstukjes worden in het labo onderzocht en het resultaat is na enkele dagen bekend. De resultaten worden naar de behandelende arts doorgestuurd.