

Afspraak

Uw afspraak is op / /

om : uur

Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen.

Telefoon: **056/ 62 33 55**

Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u

Zaterdag van 9u tot 12u

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht op het secretariaat van de Dienst Radiologie.

Telefoon: **056/ 62 33 55**

Radiologen

Dr. E. Janssens

Dr. F. Van Geluwe

Dr. J. Van Melkebeke

Dr. Tom D'Hoore

Dr. Simon Vanden Berghe

Contact

Secretariaat radiologie:

056/ 62 33 55

Telefoonnummer onthaal:

056/ 62 31 11



Infobrochure
RADIOLOGIE

Auteur: Dienst Radiologie
Publicatiedatum: Oktober 2021
Doc: 5708

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

RX Hysterografie of Hystero-Salpingografie (HSG)

Wat is een hysterografie (HSG)?

Bij dit onderzoek brengt men de baarmoeder en de eileiders in beeld door toediening van een contrastvloei-stof via de vagina.

Verloop van het onderzoek

Er is voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

U wordt opgeroepen vanuit de wachtzaal door een verpleegkundige die u begeleidt naar het kleedhokje en de onderzoekzaal. Zij zal u vragen het onderlichaam vrij te maken.

Vervolgens mag u plaatsnemen op de röntgentafel in gynaecologische houding.

Uw gynaecoloog doet zelf het onderzoek. Hierbij wordt hij/zij door een verpleegkundige geassisteerd, terwijl de radioloog opnames van de onderbuik maakt.

De gynaecoloog brengt een speculum in de vagina. Dit kan koud en onprettig aanvoelen.

De vagina wordt ontsmet en de gynaecoloog plaatst een metalen spuitje (zonder naald) tegen de baarmoederhals. Via dit metalen spuitje wordt er contrastmiddel ingespoten.

Dit kan soms pijn in de onderbuik veroorzaken, toch is het noodzakelijk dat u zich zoveel mogelijk ontspant.

Aansluitend worden de röntgenopnames gemaakt.

COMPLICATIES

geen

Duur

Het onderzoek zelf duurt ongeveer een 15-tal minuten.

Nazorg

Na het onderzoek krijgt u een maandverband om de contrastvloei-stof op te vangen die zich nog in de baarmoeder en de vagina bevindt.

U kan na het onderzoek last hebben van de volgende verschijnselen:

- Vaginaal bloedverlies
Is onschuldig, kan enkele dagen duren en gaat over in bruine afscheiding.
- Buikpijn
Kan een dag "zeurend" aanwezig blijven maar verdwijnt meestal snel.

