



Emla® bij kinderen

Crème of patch



Wat is emla®?

Emla® is een crème die rechtstreeks op de huid of als pleister (patch) wordt aangebracht en de huid plaatselijk verdooft.

Wanneer aangewezen?

De crème zal door uw arts voorgeschreven worden en kan gebruikt worden bij:

- Een bloedafname
- Een injectie vb.: vaccinatie
- Plaatsen van een infuus
- Aanprikken poortkatheter
- Een lumbale punctie

Wanneer niet gebruiken?

Emla® mag niet gebruikt worden op een open wonde, plaats van eczeem, in de slijmvliezen, ogen, oren, neus, mond of anus.

Tijdstip van aanbrengen?

Emla® wordt minimum 1u (bij voorkeur 1,5u) voor de procedure aangebracht en mag tot 4u ter plaatse blijven als uw kind ouder is dan 12 maanden. Als uw kind jonger is dan 12 maanden dan is dit 1 uur.



**1,5 uur tot
1 uur voor
de procedure**



Waar aanbrengen?



Voor bloedafname

Op de handrug
of in de elleboogplooi



Voor vaccinaties

< 1 jaar: middelste 1/3 van het
bovenbeen aan de voorzijde.



> 1 jaar: buitenkant van de bovenarm,
3 vingers onder de schouder.



Hoe emla® crème aanbrengen?

- Controleer of de aangeduide huidzone intact, droog en proper is.
- Breng de crème rechtstreeks uit de tube aan op de aangeduide huidzone. **Wrijf de crème niet open.**
- Verwijder de bescherm laag van de plakkende kant van de pleister.
- Verwijder het beige middenstuk van de pleister. Er blijft een omlijsting van papier over.
- Breng vervolgens de pleister zorgvuldig aan over het hoopje crème.
- Verwijder de papieren rand en druk de randen goed aan.
- Plooi een hoekje om zodat de pleister gemakkelijk kan verwijderd worden.
- Wanneer uw kind reageert op kleefpleisters of wanneer u nog crème over hebt maar geen pleisters meer, kan u ook gewone huishoudfolie gebruiken om de crème af te dekken. Wikkel deze folie over de crème zodat de crème mooi ter plaatse blijft.
- Draai de dop van de tube terug goed dicht en bewaar de tube tussen 15°C en 25°C. De crème is houdbaar tot de vervaldatum die op de tube vermeld staat.





De emla® patch


- De EMLA-patch is een kant-en-klare pleister met ingebouwde verdoving. U hoeft geen crème aan te brengen of af te dekken – de patch is meteen gebruiksklaar.

Hoe patch aanbrengen?

- De patch mag niet doorgesneden of in kleinere stukken verdeeld worden.
- Druk op de hoeken van de pleister voor een goede hechting aan de huid. Druk niet in het midden van de pleister want hierdoor kan de crème onder de kleefstof terechtkomen.

Noteer hier het tijdstip van aanbrengen

.....



Hoeveelheid?

Leeftijd	Aanbevolen dosis/locatie	Maximale dosis	Maximaal
0-2 maanden (< 5 kg)	0,5 - 1g	1g	1
3-12 maanden (> 5 kg)	0,5 - 1g	2g	2
1-6 jaar (> 10 kg)	1 - 2g	10g	10
6-12 jaar (> 20 kg)	2g	20g	20
> 12 jaar	2 - 3g	50g	



Mogelijke bijwerkingen?

Een lichte reactie zoals bleekheid, roodheid, zwelling en jeuk kan zich voordoen op de plaats waar Emla® is aangebracht. Deze reacties zijn normaal en verdwijnen snel.

Verwittig zeker de arts als uw kind eczeem heeft.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kan u contact opnemen met uw behandelende arts of met het secretariaat (056/62.35.50).





Kleurtekening + zoek de 10 verschillen

Contact

Secretariaat pediatrie
9u-13u en 14u-17u
pediatrie@ziekenhuiswaregem.be
prosa@ziekenhuiswaregem.be
056/ 62 35 50



Auteur: Dienst Kindergeneeskunde
Publicatiedatum: Juni 2026
Doc: 8611

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

