

Een zoektocht naar de juiste oplossing

9 november 2023


Ranson Greta

TIME (D) (H)

Het TIME concept is een classificatiemodel dat binnen
de wondzorg gebruikt wordt om een wonde te kunnen
evalueren op korte en lange termijn.

T I M E (D) (H)

T van Tissue (= weefsel)



T I M E (D) (H)

I van infection (infectie)

M van Moisture (vocht)

E van Edge (wondrand)

D van Diagnose, Diepte

H van Helingstijd

VAATLIJDEN



1^{ste} casus

Pat meldt zich aan op consultatie met wonde thv de enkel,

- PTA uitvoeren
- En aangepaste wondzorg:
Isobetadine® bloedsuiker +
Antibiotica® + Dauerbinde®



Na 7
dagen



Na 14 dagen



Na 21 dagen :

Stop Antibiotica®
start Isobetadine-gel®



Na 40 dagen start Mepilex XT



Na 3 maand

2de casus



Ontsmetten met Isobetadine®, start Intrasil Conformable® en Dauerbinde® en bedrust



Na 5d



Na 14d



Na 28 d

Opnetten van de
wonde





Na 50 d

Start Mepitel® +
Flaminal Forte®



Na 70 d



Na 120 d

Start Mepilex XT®

Haematomen

1ste casus



Haematoom thv dij na val: incisie en drainage en gedeeltelijke sluiting van de wonde



Na 1 dag : reinigen en opnetten van de wonde, plaatsen van haakje + start compressie therapie lang rek





Na 9 dagen



1 maand later

2de casus



Blaar op hiel : liefst niet openen
start alcoholcompres

3de casus



1^{ste} maal op consultatie
na 10 d :

Curetteren

Start iso-betadine-wiek®





Na 21 dagen

Verder met
isobetadine-
gaze-dopper®



Na 50 dagen

Start Flaminal Hydro®

Skintears

1ste casus



Start Mepitel® + Flaminal Forte®



Na 7 dagen



Na 10 dagen : goed reinigen

2de casus





Herpositioneren en inkervingen maken.

Start Jelonet® en Flaminal Forte®



Na 11 dagen

Diabetische voet





1ste casus

Na amputatie en
opnetten onder narcose:
start NDT







5 dagen later: verder NDT



6 weken later : start Isobetadine Tule[®]

2de casus







3de casus



Botcontact !!!!



Ontsmetten met Isobetadine® en Isobetadine-tule®



10 dagen later

Aangepaste schoenen

Voorvoetontlasting



Verbandschoen



Steunzolen



op maat gemaakte schoenen



Opnetten wonden

Stitch cutter



Dermal curette ref MK407



1ste casus



2de casus



3de casus





Start Flaminal Hydro®

4de casus





Start Intravite Conformable®

5de casus





6de casus





7de casus



8ste casus



Viltontlasting





Zwachtelen

Voet steeds volledig zwachtelen







GEEN Peha-haftszwachtel gebruiken bij vaatoperaties, wel Surgifix









Aanbrengen van compressietherapie

Lange rek



Houd de voet van de patiënt in een rechte
hoek ten opzichte van het onderbeen



Breng een circulaire slag aan met de zwachtel om de voet net voorbij de teenbasis.





Vervolg met een slag over de hiel waarbij 2/3 van de breedte van de zwachtel boven de hiel en 1/3 onder de voet komt



Breng een tweede slag over de hiel aan waarbij $\frac{2}{3}$ van de zwachtel onder de voet komt en $\frac{1}{3}$ boven de hiel.







Zorg voor een constante spanning op de rol bij het aanbrengen.



De zwachtel volgt verder het been





Sla de zwachtel circulair om het been ter hoogte van de fibulaknobbel (2 cm onder de knieholte) om hem te fixeren en afzakken te vermijden





Korte rek





NO BRANDING OF INTERIOR BAND

Do not use on a patient's face or neck
Do not use on a patient's head
Do not use on a patient's chest
Do not use on a patient's back
Do not use on a patient's arms or legs
Do not use on a patient's hands or feet
















Breng een 2^{de} zwachtel aan maar rol de zwachtel af met de rol naar beneden gericht: je begint weer in het midden van de voet



Je gaat weer over de hiel en de enkel naar boven tot onder de knie











In een variant op deze techniek vertrekt de zwachtel aan de knie en zo naar beneden tot aan de voet.





Compressiekousen

Rondbreikousen: zijn naadloos

Vlaktbrei-compressiekousen: hebben een naad



Hulpmiddelen



Aantrekhandschoen



Butler

Huidenten



Na 5 dagen operatie





Na 4 dagen operatie



Op de donorzone : Biatain Alginaat[®] eventueel er bovenop nog een Isobetadine Tule[®] leggen en afdekken met een gewatteerde compres en afkleven met Fixomull Stretch[®]



3 dagen later





10 dagen later



3^{de} graads brandwonde : beslist voor een huident

Na 5 dagen operatie









Donorzone :

- hydrateren met Nivea
- beschermen met een zonnecreme factor 50



Na 22 dagen operatie : hydrateren en beschermen tegen de zon

Wondprotocol

